


2006 A II Angabe

| | | |
|----|-----|---|
| BE | 1.0 | Gegeben ist die reelle Funktion $f: x \mapsto x \cdot (2 - \ln x)^2$ in der maximalen Definitionsmenge $D_f =]0; \infty[$. Der Graph von f wird mit G_f bezeichnet. |
| 7 | 1.1 | Erläutern Sie, dass f eine in D_f stetige Funktion ist und untersuchen Sie das Verhalten des Graphen G_f bei Annäherung an die Ränder der Definitionsmenge. |
| 3 | 1.2 | Untersuchen Sie, wie sich die Steigung von f bei rechtsseitiger Annäherung an die Stelle $x = 0$ verhält. [Teilergebnis: $f'(x) = (-\ln x) \cdot (2 - \ln x)$] |
| 7 | 1.3 | Bestimmen Sie Art und Koordinaten der Extrempunkte des Graphen G_f . |
| 8 | 1.4 | Untersuchen Sie das Krümmungsverhalten des Graphen G_f , geben Sie die Koordinaten des Wendepunkts an und zeigen Sie, dass -1 der kleinste Steigungswert der Funktion f ist. |
| 10 | 1.5 | Zeichnen Sie unter Verwendung schon bekannter Ergebnisse und geeigneter Funktionswerte den Graph G_f und den Graph $G_{f'}$ der Ableitungsfunktion f' für $0 < x \leq 10$ in ein gemeinsames kartesisches Koordinatensystem. (Maßstab: 1 LE = 1 cm) |
| 6 | 1.6 | Die Graphen G_f und $G_{f'}$ schneiden sich an den drei Stellen $x_1, x_2 = e^2$ und x_3 , wobei $x_1 < x_3$. Berechnen Sie die Schnittstelle x_1 mit Hilfe des Newton-Verfahrens. Verwenden Sie dabei als Startwert $x_0 = 0,5$ und führen Sie zwei Näherungsberechnungen durch. Geben Sie die für die Berechnung notwendigen Teilergebnisse auf drei Nachkommastellen gerundet an. [Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass der Ansatz $f(x) = f'(x)$ nach weiterer Vereinfachung auf die Gleichung $2x - x \cdot \ln x + \ln x = 0$ führt.] |
| 4 | 1.7 | Kennzeichnen Sie das Flächenstück, das der Graph $G_{f'}$ der Ableitungsfunktion f' zwischen seinen beiden Nullstellen mit der x -Achse einschließt und berechnen Sie die Maßzahl seines Flächeninhalts. |
| 4 | 1.8 | Begründen Sie, dass der Grenzwert $\lim_{a \rightarrow 0} \int_a^1 f'(x) dx$ existiert, und geben Sie seinen Wert an. |

- 2.0 Nebenstehendes Diagramm entspricht näherungsweise dem Verlauf einer lokal beschränkten Epidemie innerhalb einer Bevölkerung. Für die zeitliche Abhängigkeit der Anzahl der Erkrankten in Tausend gilt ohne Berücksichtigung der Einheiten die Gleichung



$$N(t) = 15 \cdot e^{-0,1 \cdot (t-8)^2},$$

wobei t als Zeitangabe in Wochen zu interpretieren ist.

Zunächst sind nur wenige Personen von der Krankheit betroffen, jedoch breitet sie sich wegen der hohen Ansteckungsgefahr schnell in der Bevölkerung aus. Wegen der anlaufenden Impfaktion und der Personen, die die Krankheit überstanden haben, steigt der Bevölkerungsanteil der gegen die Krankheit immunen Menschen. Dadurch sinkt der Anstieg der Neuerkrankungen und die Epidemie klingt ab.

- 6 2.1 Berechnen Sie die Zeitspanne, in der sich die Anzahl der Krankheitsfälle bezogen auf das Ende der 1. Woche auf den dreifachen Wert vergrößert.
- 9 2.2 Bestimmen Sie rechnerisch den Zeitpunkt, in dem die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Krankheit am stärksten ist. Geben Sie auch die Anzahl der Neuerkrankungen pro Tag für diesen Zeitpunkt an.
- 3 2.3 Ermitteln Sie durch Rechnung den Hochpunkt der Funktion N und interpretieren Sie die Koordinaten des Hochpunkts im Sinne der Aufgabenstellung.
- 3 2.4 Die Epidemie gilt als überstanden, wenn wieder der Krankenstand wie zur Zeit $t = 0$ erreicht ist. Berechnen Sie diesen Zeitpunkt.